




A NYULAK MYXOMATOSISA



Összeállította:

Dr. Sütő András

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 114. Tel.: 33-55-611

A nyulak **myxomatosisa** a házi-, és az üreginyulakban fordul elő. A betegséget vírus (**Leporipox vírus**) okozza, terjesztésében főleg **szúnyogfélék** – esetenként szúrólegyek, és bolhák - vesznek részt. Amint a vírus a vérszívás alatt bejutott a szervezetbe, szétszóródik, és zárványokat alakít ki.

A betegség klinikai tüneteire jellemző, hogy a **fejen, a fülön, a szemhéjakon, az orr bőrén** (lásd jobb oldali kép) **és a természetes testnyílások környékén nagy vizenyős duzzanatok alakulnak ki.**

A folyamathoz még gennyes kötőhártya-gyulladás, és orrhurut is társul. A lappangási idő (a fertőződés, és az első tünetek kialakulása között eltelt idő) **7-10 nap**. Később az egész fejet vizenyős duzzanatok borítják be (oroszlánfej). A hatalmas kocsonyás duzzanatok súlyuknál fogva lehúzzák a füleket. (lásd bal oldali kép) **A betegek légzési nehézségek, és tüdőgyulladás tünetei között általában egy hét alatt elhullanak.**

Megelőzés céljából fontos, hogy a szúnyogokat tartsuk távol az állatoktól, valamint évenként, minden 3 hónapnál idősebb nyulat még a szúnyogszezon előtt **vakcináztassunk.**

A betegség jelentkezése esetén a beteg állatokat ki kell irtani, és a zárlat alá helyezett területen az összes nyulat védőoltásban kell részesíteni.