

Tartsunk Plattit!

A platti (széleshátú fogasponty, *Xiphophorus maculatus*) az elevenszülő fogaspontyok közé tartozik. Ovovivipar, azaz a megtermékenyítés nem a külvilágon, hanem a nőtény hasában történik meg, a kis halak is ott fejlődnek ki. A hím 3 cm, a nőtény akár az 5-6 cm-es nagyságot is elérheti. Megkülönböztetésük felnőtt korban könnyű: a hímeknek ún. gonopódiuma van, ami a farok alatti úszó módosulata. Az ivarérettség elérésekor csőszerű szervvé módosul, amelynek segítségével a hímivarsejteket a nőténybe juttatja. Így az ivari dimorphysmus (kétfalakúság) kifejezett. Különböző színváltozataik ismertek: leggyakoribb a vörös, a vörös-fekete, de létezik fekete-fehér, vörös-sárga, fehér-vörös, albínó, és sárga is.

Békések, a többi hallal jól megférnek, így vegyes populációban is tarthatjuk őket. Igénylik a dús növényzetet, ahol a nőtények „megszülhetik” kicsinyeiket. Nem alkotnak családot, a kishalak azonnal önállóak, rögtön a felszínre igyekeznek, hogy úszóhólyagjukat légköri oxigénnel töltsék meg. Ha ez nem sikerül, akkor életük végéig hasonúszók lesznek.

Igénylik a meleget, a kb. 20 fokos víz a legmegfelelőbb számukra. A hirtelen környezetváltozásra érzékenyek, az a nőtényekből koraszülést válthat ki. Ezért a frissen vásárolt halakat nylonzacskóval együtt helyezzük az akváriumba, és várjunk, amíg a hőmérséklet kiegyenlítődik.

A kicsiket apró vízibolhával, szárított eleséggel, apróra vágott és kimosott tubifex-szel, a nagyobbakat szúnyoglárvával, és tubifex-szel etethetjük.

Összeállította: Dr. Sütő András
Kisállatgyógyász szakállatorvos

